

| | | |
|---|---|--|
| Formål: At sikre, at enhver ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler til patienter er entydig, korrekt og kun udført af personale med relevant uddannelse samt at forebygge utilsigtede hændelser indenfor gældende områder. | | |
| Målgruppe: Akuthjælper i RSYD | Redaktør: Ambulanceinstruktør, Ambulance Syd | Godkendt den: 21-06-2019 Gældende til den: 31-12-2022 |
| Ansvarlig for dokument: Præhospital chef, RSYD | Version: 1 | |

Gældende for:
**Akuthjælper Region
Syddanmark**

Hjertemagnyl

| | |
|-------------------|---|
| Anvendelse | <p>Må gives til Patienter med symptomer på blodprop i hjertet eller hjertekramper. Symptomer på dette er: Trykken eller ubehag i brystet, evt. ledsaget af kortåndethed (patienten virker forpustet).</p> <p>Hvordan Inden der gives magnyl, <u>SKAL patienten spørges: "Er du allergisk overfor magnyl"?</u></p> <p>Der fremtages 1 doseringspose med 4 tabletter (i alt 300 mg magnyl). Dette er dosis til 1 patient! Læs vejledningen på posen før tabletterne gives til patienten.</p> |
| Vigtigt | <p>Må IKKE gives til <u>Patienter med kendt allergi overfor magnyl (Acetylsalicylsyre, ASA)</u></p> <p><u>Ved den mindste tvivl – kontakt AMK vagtcentralen på 70 15 12 50–</u> <u>Bed om at tale med den sundhedsfaglige, og spørg om I må give magnyl?</u></p> <p>Bivirkninger Magnyl kan give bivirkninger, men de er sjældne ved en enkelt dosis Bivirkninger kan være: Mavesmerter, kvalme, halsbrand, øget tendens til blødning, allergiske reaktioner</p> <p>Indsatsjournal Husk at udfylde et akuthjælper medicinkort som overbringes til ambulancepersonale/ helikopterlægen. Husk også at notere i indsatsjournal i fri tekst, at der er givet Magnyl!</p> |
| Særligt | <p>Værd at vide Magnyl indeholder det virksomme stof Acetylsalicylsyre (forkortet ASA). En tablet indeholder 75 mg ASA.</p> <p>Magnyl virker ved at nedsætte blodpladernes evne til at danne blodpropper, derfor kan det anvendes til at forebygge blodprop i hjertet.</p> |