

Formål: At sikre, at enhver ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler til patienter er entydig, korrekt og kun udført af personale med relevant uddannelse samt at forebygge utilsigtede hændelser indenfor gældende områder.		
Målgruppe: Akuthjælper i RSYD	Redaktør: Ambulanceinstruktør, Ambulance Syd	Godkendt den: 16-10-2019 Gældende til den: 16-10-2022
Ansvarlig for dokument: Præhospital chef, RSYD	Version: 1	

Gældende for:
**Akuthjælper Region
Syddanmark**

Hjertemagnyl

Anvendelse	<p>Må gives til Patienter med symptomer på blodprop i hjertet eller hjertekramper. Symptomer på dette er: Trykken eller ubehag i brystet, evt. ledsaget af kortåndethed (patienten virker forpustet).</p> <p>Hvordan Inden der gives magnyl, <u>SKAL patienten spørges: "Er du allergisk overfor magnyl"?</u></p> <p>Der gives 1 dosispose (4 piller * 75 mg) i alt 300 mg magnyl. Tabletterne skal tygges inden de synkes. Tabletterne smager meget surt! Giv patienten vand at skylle pillerne ned med, så opløses stoffet hurtigere.</p>
Vigtigt	<p>Må IKKE gives til <u>Patienter med kendt allergi overfor magnyl (Acetylsalicylsyre, ASA)</u></p> <p><u>Ved den mindste tvivl – kontakt AMK vagtcentralen på 70 15 12 50–</u> Bed om at tale med den sundhedsfaglige, og spørg om I må give magnyl?</p> <p>Bivirkninger Magnyl kan give bivirkninger, men de er sjældne ved en enkelt dosis Bivirkninger kan være: Mavesmerter, kvalme, halsbrand, øget tendens til blødning, allergiske reaktioner</p> <p>Indsatsjournal Husk at notere i indsatsjournal i fri tekst, at der er givet Magnyl, og husk også at fortælle det til ambulancepersonale/ helikopterlægen</p>
Særligt	<p>Værd at vide Magnyl indeholder det virksomme stof Acetylsalicylsyre (forkortet ASA). En tablet indeholder 75 mg ASA.</p> <p>Magnyl virker ved at nedsætte blodpladernes evne til at danne blodpropper, derfor kan det anvendes til at forebygge blodprop i hjertet.</p>