

Formål: At sikre, at enhver ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler til patienter er entydig, korrekt og kun udført af personale med relevant uddannelse samt at forebygge utilsigtede hændelser inden for gældende områder.

Målgruppe: Akuthjælper i RSYD

Redaktør: Ambulanceinstruktør, Ambulance Syd

Godkendt den: 06-06-2023
Gældende til den: 06-06-2026

Ansvarlig for dokument:
Præhospital chef, RSYD

Version: 3

Iltbehandling

Anvendelse

Må bruges til: Ilt gives til patienter med **hjertestop eller påvirket vejtrækning, kredsløb, og/eller påvirket bevidsthed.**

Lommemaske/Ventilationsudstyr (Indblæsningsmaske) 10 L /min.: **Bruges til patienter med hjertestop.**

Iltbrille til næsen 3 L /min.: Må gives til patienter med hjerteproblemer, som **IKKE opfylder krav til behandling med maske.**

Iltmaske med pose 10 L /min.: Gives til **vågne eller bevidsthedspåvirkede patienter** med:

- Åndenød
- Tegn på iltmangel (**blå fingre, læber, øreflipper**)
- Bevidsthedspåvirkede der **ikke** kan vækkes, men som **SELV TRÆKKER VEJRET!**
- Patienter med kramper.
- Dykkersyge.
- Røgforgiftede.
- Traume/tilskadekomne med **påvirket** bevidsthed, vejtrækning og/eller smerter.

Værd at vide:

Medicinsk gas – der skal tilladelse til at håndtere gasser til medicinsk brug.
Ilt er en farveløs og lugtfri luftart, som hverken kan ses eller smages.

Når iltindholdet i luften stiger, øges brandrisikoen.
Tobaksrygning, eller anden brug af åben ild i nærheden er forbudt!

Brug aldrig værktøj og forsøg aldrig selv at reparere.

Smør aldrig udstyret med olie, da olie og ilt sammen udgør en risiko.

Bærbart iltudstyr skal bæres i den taske der er konstrueret til formålet.

Husk at dokumenterer hvad du har givet af ilt på dit medicinkort, så du kan give dette til redderne/helikopterlægen.



Iltmaske med reservoir - Klargøring i 3 trin:

Husk handsker før brug:



Hold en finger på ventilen så posen fyldes helt



Stram elastikken så masken sidder tæt til ansigtet



Tryk næse klemmen sammen, så masken slutter helt tæt



Iltbrille

De 2 små udgange placeres, en i hvert næsebor, slangen føres rundt bag om ørerne



1 – Masken trykkes ud og studsens sættes på.

2 – Der holdes frie luftveje ved at holde patientens hage op mod masken, mens hovedet vippes let bagover