

Formål: At sikre, at enhver ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler til patienter er entydig, korrekt og kun udført af personale med relevant uddannelse, samt at forebygge utilsigtede hændelser indenfor gældende områder.

Målgruppe: Akuthjælper i RSYD

Redaktør: Ambulanceinstruktør, Ambulance Syd

Godkendt den: 06-06-2023
Gældende til den: 06-06-2026

Ansvarlig for dokument: Præhospital chef, RSYD

Version: 3

Hjertemagnyl

Anvendelse	<p>Må gives til: Patienter med bryst smerter. Symptomer er: Trykken/ubehag/smerter i brystet. Evt. ledsaget af åndenød.</p> <p>HUSK: <u>Inden der gives Magnyl SKAL du spørge om patienten er allergisk overfor hjertemagnyl?</u> (indholdsstof acetylsalicylsyre)</p> <p>Dosis: Der gives 1 dosispose, som indeholder (4 piller x 75 mg) i alt 300 mg Magnyl. Tabletterne skal tygges inden de synkes. Tabletterne smager surt. Giv patienten vand at skylle pillerne ned med, så opløses pillerne hurtigere.</p>
Vigtigt	<p>Må IKKE gives til: <u>Patienter med kendt allergi overfor Hjertemagnyl (Acetylsalicylsyre, ASA, magnyl)</u> Mistanke om blodprop andre steder end i hjertet. Patient som aktuelt bløder.</p> <p>Bivirkninger: <u>Er du i tvivl – kontakt AMK vagtcentralen på 70 15 12 50–</u> Bed om at tale med den sundhedsfaglige, og spørg om du må give Magnyl?</p> <p>Indsatsjournal: Hjertemagnyl kan give bivirkninger, men de er sjældne ved en enkelt dosis. <u>Bivirkninger kan være:</u> Mavesmerter, kvalme, halsbrand, øget tendens til blødning, allergiske reaktioner.</p> <p>Husk at skrive i indsatsjournalen, under fri tekst, at der er givet tbl. Magnyl, og hvor meget der er givet. Medicinkort udfyldes, og udleveres til ambulancepersonale/helikopterlægen.</p>
Særligt	<p>Værd at vide: Hjertemagnyl mindsker blodets evne til at størkne. Det er netop derfor at det skal gives ved mistanke om blodprop i hjertet.</p>